

R/I grubu üzerinde çarpma işlemi

$$\begin{aligned} \cdot : R/I \times R/I &\rightarrow R/I \\ (a+I, b+I) &\mapsto ab+I \end{aligned}$$

şeklinde tanımlansın. Kolayca görülebilir ki bu işlem iyi tanımlıdır ve $(R/I, +, \cdot)$ değişmeli ve birimli bir halkadır.

$$0_{R/I} = I = 0+I = a+I \quad (a \in I)$$

$$1_{R/I} = \frac{1}{a} + I \quad a+I = b+I \Leftrightarrow a-b \in I$$

J , R nin I 'yi iceren bir ideali ise

$$J/I = \{ a+I : a \in J \}$$

kümesi R/I halkasının bir idealidir.

2 Lemma R bir halka ve I R nin bir idealı olsun. O zaman $f : R \rightarrow R/I$, her $r \in R$ için $f(r) = r+I$ şeklinde tanımlanan dönüşüm çekirdeği I olan bir halka epimorfizmasıdır. Bu epimorfizma ya bir kanonik epimorfizma denir.

3. Teorem. (izomorfişma Teoremi) $f : R \rightarrow S$ bir halka hom. alalım.

O zaman

$$\bar{f} : \frac{R}{\text{Ker}(f)} \rightarrow S$$

$$r+\text{Ker}(f) \mapsto f(r)$$

şeklinde tanımlanan dönüşüm bir halka monomorfizmasıdır. Özel olarak

$$\frac{R}{\text{Ker}(f)} \cong f(R)$$

Kanıt. $a+\text{Ker}(f) = b+\text{Ker}(f) \Rightarrow f(a) = f(b)$?

$$a + \text{Ker}(f) = b + \text{Ker}(f) \Leftrightarrow a - b \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(a-b) = 0 \Leftrightarrow f(a) = f(b)$$

\bar{f} iyi tanımlı ve 1-1.

f nin bir halka hom. old. oaktır.

$$f\left(\frac{1}{1 + \text{Ker}(f)}\right) = f(1 + \text{Ker}(f)) = f(1) = 1$$

□

idealının üreteılması

Not: R bir halka ise R nin kendisi her zaman bir idealdır. I R 'nin bir ideal olmak üzere $I \neq R$ ise I 'ya R 'nin bir öz idealı denir.

$\{0_R\}$ kümesi de R 'nin bir idealidir. $\{0_R\}$ idealini genellikle kısaca 0 şeklinde gösterceğiz.

4. Lemma R bir halka ve $a \in R$ olsun. $aR = \{ar : r \in R\}$ kümesi R 'nin a 'yi içeren bir idealidir.

Yukarıdaki lemmada bahsedilen aR idealı alternatif olarak (a) ya da Ra şeklinde de gösterilebilir.

$$R = (1) \text{ ve } 0 = (0)$$

$a \in R$ için $(a) = R \Leftrightarrow a$ birimsel

$(\Rightarrow) (a) = R \Leftrightarrow 1 \in (a) \Leftrightarrow 1 = ab \text{ o.s. } b \in R \text{ var.}$

R bir halka ve $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ R nin ideallarının bir ailesi olsun. O zaman

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda$$

kümesi de R nin bir idealidir. Eğer $\lambda = \emptyset$ ise $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda = (0)$ olurak kabul edilecektir.

$H \subseteq R$ alalım. HR, RH ya da (H) ile

$$\bigcap \{I : I, R \text{ nin bir idealive } H \subseteq I\}$$

I idealini gösterelim. (H) ideali H kümelerini içeren R nin en küçük idealidir. Bu idealde R nin H kümeleri tarafından üretilen ideali denir. $H = \emptyset$ ise $(H) = \{0\}$ olsak kabul edeceğiz.

5. Önerme. R bir halka ve $\emptyset \neq H \subseteq R$ olsun. O zaman

$$(H) = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i h_i : n \in \mathbb{N}, r_1, \dots, r_n \in R, h_1, \dots, h_n \in H \right\}$$

dur.

Kanıt. Esitliğin sağ tarafına I diyelim. Önce I nin bir ideal olduğunu gösterelim. $0 \in I$ olduğunu açıktır. $x, y \in I$ olsun.

$$x = r_1 h_1 + \dots + r_n h_n$$

$$y = r'_1 h'_1 + \dots + r'_m h'_m$$

O.S. $r_i, r'_j \in R$ ve $h_i, h'_j \in H$ ($n, m \in \mathbb{N}$) vardır.

$$x+y = r_1 h_1 + \dots + r_n h_n + r'_1 h'_1 + \dots + r'_m h'_m = \sum_{i=1}^{n+m} r_i h_i \in I$$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $r_{n+1} \quad h_{n+1}$ $\downarrow \quad \downarrow$
 $r'_{n+m} \quad h'_{n+m}$

$$r \in R \text{ alalım. } rx = r \sum_{i=1}^n r_i h_i = \sum_{i=1}^n (rr_i) h_i \in I$$

$\therefore I$ R 'nin bir idealidir.

$$h \in H \text{ olsun. } h = l \cdot h \quad r_l = l \text{ alınırsa } h = \sum_{i=1}^l r_i h \in I$$

$$\therefore H \subseteq I$$

$$\therefore (H) \subseteq I.$$

Öte yandan $H \subseteq (H)$ ve (H) R nin bir idealı olduğunu elde etmek için $\sum_{i=1}^n r_i h_i$ ($h_i \in H$) tipindeki her elemanın (H) içine düşer.

$$\therefore I \subseteq (H).$$

$$\therefore (H) = I.$$